

**Sensibilitat als antifúngics de *Candida* aillats durant els  
anys 2003-2007 en el Laboratori de Microbiologia de  
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**

**Estudi de la sensibilitat als antifúngics de 119 soques de *Candida* aïllades de d'hemocultiu. Anys 2003-2007**

		FLUCONAZOL		ITRACONAZOL		VORICONAZOL	
	nº soques	S-DD 16-32 ( $\mu\text{g/ml}$ )	R $\geq 64$ ( $\mu\text{g/ml}$ )	S-DD 0,25-0,5 ( $\mu\text{g/ml}$ )	R $\geq 1$ ( $\mu\text{g/ml}$ )	S-DD 2 ( $\mu\text{g/ml}$ )	R $\geq 4$ ( $\mu\text{g/ml}$ )
<i>C.albicans</i> <sup>1</sup>	52	-	1	-	1	-	1
<i>C.parapsilosis</i> <sup>1</sup>	30	-	-	2	1	1	-
<i>C.tropicalis</i>	17	-	-	3	-	-	-
<i>C.glabrata</i>	15	10	1	4	6	1	-
<i>C.lusitaniae</i>	3	-	-	-	-	-	-
<i>C.krusei</i>	1	-	1	1	-	-	-
<i>C.guilliermondii</i>	1	-	-	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>119</b>	10	3	11	8	2	1
		13 (10,9%)		19 (15,9%)		3 (2,5%)	

S-DD: sensible dosi dependent; R: resistent.

<sup>1</sup> Una soca de *C. albicans* i una soca de *C. parapsilosis* van mostrar resistència moderada a Amfotericina B (CIM 2  $\mu\text{g/ml}$ ).