



Els afectats per Parkinson amb depressió poden desenvolupar addiccions conductuals (impulse control disorders) com la ludopatia, la hipersexualitat o les compres compulsives

Taula de contingut

Els afectats per Parkinson amb depressió poden desenvolupar addiccions conductuals (impulse control disorders) com la ludopatía, la hipersexualitat o les compres compulsives	4
Estudi sobre la depressió i el Parkinson Segre Catala - 02/10/2019	5
Las personas con Parkinson y depresión tienen más probabilidades de desarrollar adicciones como la ludopatía, la hipersexualidad o las compras compulsivas. Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 01/10/2019	6
Un estudio mundial coordinado por la Fundación Michael J. RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 02/10/2019	7
El párkinson con depresión aumenta el riesgo de adicciones conductuales @ JANO.ES - 01/10/2019	8
La depresión en personas con Parkinson puede desembocar en adicciones conductuales @ ENTREMAYORES.ES - 02/10/2019	9
Els malalts de Parkinson amb depressió tenen més probabilitats de desenvolupar addiccions @ CADENA SER.COM - 01/10/2019	10
Identifiquen la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per a l'aparició d'addiccions de conducta @ LAMANYANA.ES - 01/10/2019	11
Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson @ TELEPRENSA.ES - 01/10/2019	12
Parkinson's Patients With Depression May Develop Behavioral Addictions @ BIOTECH-SPAIN.COM - 02/10/2019	13
Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones @ NAVARRAINFORMACION.ES - 01/10/2019	14
Salud.-Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson @ NOTIMERICA.COM - 01/10/2019	15
Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson @ INFOSALUS.COM - 01/10/2019	16
Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con párkinson @ GENTE DIGITAL - 01/10/2019	17
Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con párkinson @ EUROPA PRESS - 01/10/2019	18
La asociación Parkinson-depresión incrementa el riesgo de conductas adictivas @ DIARIO MEDICO - 30/09/2019	19

Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones @ ELCONFIDENCIAL.COM - 01/10/2019	20
Los enfermos de párkinson con depresión tienen más riesgo de sufrir adicciones conductuales @ AS.COM - 01/10/2019	21
Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones @ COPE - 01/10/2019	22
S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta @ SOCIAL.CAT - 01/10/2019	23
S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta @ CCMA.CAT - 01/10/2019	24
S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta @ VILAWEB.CAT - 01/10/2019	25
S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta @ ALDIA.CAT - 01/10/2019	26
Els afectats per Parkinson amb depressió poden desenvolupar addiccions conductuals @ SANTPAU.CAT - 01/10/2019	27
La asociación Parkinson-depresión incrementa el riesgo de conductas adictivas @ CEESBLOG.BLOGSPOT.COM - 30/09/2019	28
Los afectados por Parkinson con depresión pueden desarrollar adicciones conductuales @ BIOTECH-SPAIN.COM - 02/10/2019	29



Els afectats per Parkinson amb depressió poden desenvolupar addiccions conductuals (impulse control disorders) com la ludopatia, la hipersexualitat o les compres compulsives

INVESTIGACIÓ

Estudi sobre la depressió i el Parkinson

| BARCELONA | Investigadors de Barcelona han demostrat que la presència de depressió en els pacients amb Parkinson és un factor de risc i precursor per a l'aparició d'addiccions conductuals, com la ludopatia, la hipersexualitat i les compres compulsives. L'estudi, a càrrec d'un grup de l'hospital Sant Pau i el seu institut d'investigació (IIB Sant Pau), ha descobert que "la depressió precedeix fins a en cinc anys l'aparició d'addiccions" en aquests pacients.





► 01 d'octubre 2019

Per descarregar-lo, clica aquí

Las personas con Parkinson y depresión tienen más probabilidades de desarrollar adicciones como la ludopatía, la hipersexualidad o las compras compulsivas.

a les persones que tenen Parkinson més a més de pressió tenen més probabilitats de desenvolupar diccions compra exemple la ludopatia a la hipersexualitat a les compres compulsives això no te les cobert un equip i investigadors de l'Hospital Sant Pau de Barcelona Susana Rueda precio efecte fins al 40% dels pacients de Parkinson i sovint apareixen anys abans del propi Diagnòstic de la malaltia amb els metges havien observat que les addiccions conductuals eren més freqüents entre els pacients de Parkinson en depressió que entre els que no en tenien aquesta investigació descobert perquè el Dr Juan Marin és un dels autors de l'estudi . Com que quieren los mecanismos de recompensa del cerebro Pues si l'interessa el vínculo Real entre depresion y el parc és que pren la depresion las adicciones que haya una altra Acción de la recompensa en los pacientes que estan mas deprimidos . Ara podran prevenir l'aparició de les addiccions depenent del Farmacs que escullin pel Parkinson hi ha medicaments que són molt efectius per tractar la malaltia afavoreixen els comportaments additius per tant en malalts amb depressió els evitaran



► 02 d'octubre 2019

Per descargar-lo, clica aquí

Un estudio mundial coordinado por la Fundación Michael J.

org . Estudiants d'arreu del món coordinat per la fundació Michael J Fox amb participació de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i que ha permès confirmar la relació existent entre la malaltia de Parkinson i el desenvolupament de dicción sobretot en casos de depressió han havaneres . Investigadors de Sant Pau s'havien que els malalts de Parkinson pateixen adicción sí que és En aquests casos on es detecta més presència de depressió això passa en un 40% dels pacients I apareix al De la malaltia A partir d'aquí calia saber si la depressió és conseqüència de les addiccions i en canvi predisposa el comportament obsessiu perquè La identificació dels Reis per meta del tractament d'aquí la importància de l'estudi perquè com remarca el Dr Juan Marin de la unitat de trastorns del moviment i a fàrmacs que controlen la malaltia però també un venta en el risc de patir addiccions com la ludopatia la hipersexualitat o les compres compulsives en forma construcció muy útiles y muy Bueno sí que no podemos Pretender sistemáticamente de ellos demana que . El saber quien tiene Mas riesgo sí que podem a sus pacientes ponerles menos a los fármacos Que les podríem potencial aparecen adicciones les accions poden si negatives però també conductes de plaer com manualitats labors o escacs El problema és que quan es converteixen en l'eix central del pacient els efectes devastadors per el malalt i la família d'aquí el valor de saber que en cas de patir depressió es pot actuar preventivament . Rius va fent però si no tenemos Rosanas26 Mas bajas . Possibles on que suponga aro3 que poden tenir algunes pegues personalitzar el tractament és millorar la qualitat de vida i

El párkinson con depresión aumenta el riesgo de adicciones conductuales

PUBLICADO EN 'ANNALS OF NEUROLOGY' JANO.ES · 01 octubre 2019

Investigadores del Hospital de Sant Pau demuestran cómo la depresión precede hasta 5 años la aparición de adicciones en pacientes de párkinson.

Investigador...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

La depresión en personas con Parkinson puede desembocar en adicciones conductuales

La ludopatía, la hipersexualidad o las compras compulsivas son algunas de las conocidas como 'impulse control disorders' Investigadores de Sant Pau publicaron recientemente en Annals of Neurology un estudio que demuestra que la presencia de depr...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Els malalts de Parkinson amb depressió tenen més probabilitats de desenvolupar addiccions

La depressió afecta fins el 40% dels pacients de Parkinson, i sovint apareix anys abans del propi diagnòstic de la malaltia. Els metges havien observat que les addiccions conductuals eren més freqüents entre els pacients de Parkinson amb depressi...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Identifiquen la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per a l'aparició d'addiccions de conducta

01/10/2019

Barcelona » ACN

Investigadors de l'Hospital de Sant Pau demostren que la malaltia precedeix fins a cinc anys el desenvolupament de trastorns com la ludopatia

Investigadors de l'hospital de Sant Pau han pub...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson

CompartirInvestigadores de Barcelona han demostrado que la presencia de depresión en los pacientes con Parkinson es un factor de riesgo y precursor para la aparición de adicciones conductuales, como la ludopatía, la hipersexualidad y las compras ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Parkinson's Patients With Depression May Develop Behavioral Addictions

Researchers at Sant Pau have recently published in the Annals of Neurology a study that shows that the presence of depression in Parkinson's patients is a risk factor in the appearance of behavioural addictions. The work has been led by Dr. Jaume ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones

Primer plano de las manos de un enfermo de párkinson. EFE Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona concluye que las personas enfermas de parkinson que sufren depresión son más propensas a desarrollar...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Salud.-Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson

Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes IR SANT PAU - Archivo Permitirá detectar el riesgo de ludopatía e hipersexualidad en estos enfermos

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de B...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con Parkinson

El nuevo edificio del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona (IIB Sant Pau) en la calle Sant Quintí IR SANT PAU - Archivo Permitirá detectar el riesgo de ludopatía e hipersexualidad en estos enfermos
BARCELONA, 1 Oc...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con párkinson

Permitirá detectar el riesgo de ludopatía e hipersexualidad en estos enfermos

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Investigadores de Barcelona han demostrado que la presencia de depresión en los pacientes con párkinson es un factor de riesgo ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Descubren que la depresión es precursora de adicciones conductuales en pacientes con párkinson

Permitirá detectar el riesgo de ludopatía e hipersexualidad en estos enfermos

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de Barcelona han demostrado que la presencia de depresión en los pacientes con párkinson es un f...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

La asociación Parkinson-depresión incrementa el riesgo de conductas adictivas

Investigadores de Sant Pau han publicado recientemente en Annals of Neurology un estudio que demuestra que la presencia de depresión en los pacientes con Parkinson es un factor de riesgo para la aparición de adicciones conductuales. La enfermedad ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones

Barcelona, 1 oct (EFE).- Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona concluye que las personas enfermas de parkinson que sufren depresión son más propensas a desarrollar adicciones conductuales, como ludopat...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



URL: www.as.com
PAÍS: España
TARIFA: 49022 €
AUTOR: Unknown

UUM: 12993000
TVD: 4902200
TMV: 3.28 min

1 Octubre, 2019

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

Los enfermos de párkinson con depresión tienen más riesgo de sufrir adicciones conductuales

Ludopatía, hipersexualidad o hacer compras compulsivas son algunos tipos de conductas que los pacientes de párkinson que sufren problemas de depresión pueden llegar a desarrollar. Una nueva investigación a cargo de expertos del Hospital de Sant Pa...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Enfermos de parkinson con depresión tienen más riesgo de caer en adicciones

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital de Sant Pau de Barcelona concluye que las personas enfermas de parkinson que sufren depresión son más propensas a desarrollar adicciones conductuales, como ludopatía, hipersexualidad o hace...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta

Investigadors de l'Hospital de Sant Pau demostren que la malaltia precedeix fins a cinc anys l'aparició de trastorns com la ludopatia

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta

Redacció 324 01/10/2019 - 11.30

ACN Barcelona.-Investigadors de l'hospital de Sant Pau han publicat a 'Annals of Neurology' un estudi que demostra que la depressió en els pacients amb Parkinson és un factor de risc en l'apari...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta

Investigadors de l'Hospital de Sant Pau demostren que la malaltia precedeix fins a cinc anys el desenvolupament de trastorns com la ludopatia 01.10.2019 11:03

X Funcionalitat només per a subscriptors Aquesta funcionalitat és per als membres ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

S'identifica la depressió en els malalts de Parkinson com a factor de risc per l'aparició d'addiccions de conducta

Investigadors de l'Hospital de Sant Pau demostren que la malaltia precedeix fins a cinc anys el desenvolupament de trastorns com la ludopatia ACN

Barcelona.-Investigadors de l'hospital de Sant Pau han publicat a'Annals of Neurology' un estud...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Els afectats per Parkinson amb depressió poden desenvolupar addiccions conductuals

01/10/2019 Investigadors de Sant Pau han publicat recentment a l'Annals of Neurology un estudi que demostra que la presència de depressió en els pacients amb Parkinson és un factor de risc en l'aparició d'addiccions conductuals. El treball ha esta...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

La asociación Parkinson-depresión incrementa el riesgo de conductas adictivas

La asociación Parkinson-depresión incrementa el riesgo de conductas adictivas : La enfermedad de Parkinson es principalmente conocida por los temblores y las dificultades de movilidad que genera. Sin embargo, muchos pacientes a los que el tratamie...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Los afectados por Parkinson con depresión pueden desarrollar adicciones conductuales

Investigadores de Sant Pau han publicado recientemente en el Annals of Neurology un estudio que demuestra que la presencia de depresión en los pacientes con Parkinson es un factor de riesgo en la aparición de adicciones conductuales. El trabajo ha...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)